

QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES DE GRAMINÉES D'ASIE.

PAR M<sup>lle</sup> AIMÉE CAMUS.

*Ischæmum tenuifolium* A. Camus sp. nova.

*Culmi graciles, elati, teretes, superne breviter nudi, non incrassati, glabri, apice puberuli. Laminæ mediæ<sup>(1)</sup> e basi subæquilata a vagina parum distincta anguste lineares, acuminatæ, convolutæ, leviter pruinose, rigidulæ, elongatæ, 14-16 cm. longæ, 1.5-2 mm. latæ, in parte inferiore paginæ superioris sæpe pilis raris longis albicantibus adpersæ, costâ media carinata, nervis primariis utrinque 2-3 subtus prominulis percursæ; vaginæ læves, glaberrimæ. Racemi 3, subsessiles, subgraciles, 5-6 cm. longi; articuli pedicellique ciliati, obovato-ventricosi, 2/3 spiculæ subæquantes, contigui, crassissimi, spiculam crassitudine superantes vel æquantes. Spiculæ sessiles a dorso subcompressæ, 4,5 mm. longæ, lanceolatæ, acuminatæ vel acutæ, callo minuto pilis 1/3 glumæ æquantibus dense barbato; gluma I<sup>na</sup> chartacea, oblongo-lanceolata, longe attenuata, anguste truncata, sulcata, bicarinata, glabra, dorso nitida, carinis ciliatis; II<sup>da</sup> I<sup>na</sup> æquans, membranacea, marginibus hyalinis ciliolatis, navicularis, carinata, aristata, a latere compressa, 1-nervis; arista gracilissima, 9-10 mm. longa. Gluma III<sup>a</sup> paulo brevior, oblonga, acuta, hyalina; IV<sup>a</sup> ♂ III<sup>m</sup> æquans, oblonga, hyalina, fere ad medium usque bifida, lobis acutis; arista perfecta, glabra 18-20 mm. longa, columnâ e glumis longe exsertâ quam subula flavida longiore; palca quam gluma IV<sup>a</sup> brevior. Stigmata 2 lutea. Spiculæ pedicellatæ a latere subcompressæ, 3.5 mm. longæ, lanceolatæ, callo longe barbato, gluma I<sup>na</sup> papyracea, lanceolata, albida, marginibus implicatis ciliata, II<sup>da</sup> chartacea, lanceolata, acuminata, mucronata; III<sup>a</sup> quam II<sup>da</sup> paulo brevior, hyalina.*

Cochinchine et Laos (Counillon).

*I. tenuifolium* forme un passage entre la section *Polliniopsis* du sous-genre *Euschæmum* et le sous-genre *Digastrum*. Il a les articles du rachis et les pédicelles très renflés-ventrus comme dans le sous-genre *Digastrum*

(1) Malheureusement je n'ai eu pour décrire cette plante qu'un échantillon dont les feuilles radicales et la souche manquaient.

mais il a plusieurs faux-épils fasciculés et l'épillet pédicellé est ♂ et formé d'une glumelle et de deux glumes alors que dans le sous-genre *Digastrum* le faux-épi est solitaire et l'épillet pédicellé réduit à deux glumes.

Cette espèce doit être rattachée à la section *Polliniopsis* du sous-genre *Euischœnum*. Elle diffère de *P. brachyatherum* Fenzl., espèce d'Abyssinie, par : ses faux-épils subsessiles, ses épillets bien plus courts, à callus très fortement poilu, ses épillets sessiles à glume sup. aristée, ses épillets pédicellés ♂. Elle se distingue de *P. pilosum* Hack., espèce de l'Inde, par : son rachis et ses pédicelles d'un jaune brillant munis de longs poils blancs sur la face cachée et aux bords et à face externe très lisse, luisante, ses épillets sessiles à glume inférieure glabre sauf le callus et à glume supérieure aristée enfin par l'arête bien plus développée dans la fleur supérieure des épillets sessiles.

**Lophopogon intermedius** A. Camus sp. nova.

*Lophopogon intermedius* A. Camus, sp. nova; *Apocopsis Wightii* v. *spiculis majoribus* Balansa ap. Morot, *Journ. de Bot.* (1890), p. 84.

Perennis. Culmi erecti, robusti, superne graciles, plurinodes, hirsuti, infra rucemos sericeo-pubescentes, ad apicem usque foliati, 40-70 cm. alti. Laminæ e basi subangustata a vagina parum distincta lineares, apice attenuatæ, acutæ vel acuminatæ, planæ, rigidulæ, 10-15 cm. longæ, 4-6 mm. latæ, subtus pilis adpersæ, supra sericeo-villosæ, margine scaberulæ, costa media inferne crassiusculæ, nervis lateralibus tenuibus. Vaginæ arctæ, hirsutæ, inferiores aggregatæ. Ligula brevissima membranacea, longe pilosa. Racemi gemini, erecti, 4-6.5 cm. longi, pilis luteis ciliati. Rhachis subdistincte articulata subtenax; articuli spicula 3-4 plo breviores, lineares, ciliati. Spiculæ sessiles ♂ 6-8 mm. longæ; callus longe barbatus. Gluma I<sup>ma</sup> subcoriacea, obovato-oblonga, apice rotundata vel subtruncata, subintegra vel breviter 7-dentata, dorso convexo glaberrima, 7-nervis, margine ciliolata; II<sup>a</sup> quam I<sup>ma</sup> paulo longior, chartacea, oblonga, truncata, obtuse carinata, apice ciliata; III<sup>a</sup> ♂ I<sup>am</sup> paulo superans, oblongo-lanceolata, glabra, apice ciliolata; stamina 2. Gluma IV<sup>a</sup> brevior, anguste linearis, ♂, apice attenuata vel 2-dentata, aristata, lobis subacutis, ciliolatis; arista 2-3 cm. longa, subperfecta, sericea, luteola, columnâ quam subula paulo brevior, ejus palea hyalina, oblonga, ciliolata, bidentata; stamina 2; antheræ 4-5 mm. longæ. Spiculæ pedicellatæ (♀) demum a pedicello solutæ, 5 mm. longæ, pilosæ, flavæ, lineares, tertiussculæ; pedicellus 1.5 mm. longus; gluma I<sup>ma</sup> chartaceo-membranacea, subtruncata, sericeo barbata; II<sup>a</sup> I<sup>am</sup> paulo superans, oblonga, subobtusata, pilosula; III<sup>a</sup> oblonga, hyalina, ciliolata; IV<sup>a</sup> angustissime linearis, apice attenuata; arista 3 cm. longa, pilosa, ejus palea hyalina in lobos 2 fissa. Ovarium glabrum. Stigmata 2, elongata, stylis plerumque 5-6-plo longiora, ex apice spiculæ exserta.

Tonkin : Ononbi (Balansa, n° 394) : Sept Pagodes (Mouret, n° 542) ;  
Phu quoc (Pierre, Godefroy, n° 935)

Cette plante a été rattachée par Balansa au genre *Apocopis* dont elle a d'ailleurs le port, les épillets étroitement imbriqués et les deux faux-épis souvent plus ou moins soudés en un seul. Ce *Lophopogon* se distingue des *Apocopis* par : ses épillets sessiles seulement ♂ et ses épillets pédicellés non réduits au pédicelle, mais fertiles ♀, aristés et caducs. Tous ces caractères sont bien ceux du genre *Lophopogon*. Les épillets pédicellés sont, dans cette espèce, cachés par les épillets sessiles très appliqués contre le rachis et à glume inf. développée. Cette disposition rappelle un peu la disposition de la partie sup. des faux-épis des *Heteropogon*. Le *L. intermedius* A. Cam. se différencie du *L. truncatiglumis* Hack. avec lequel il a des affinités par : ses faux-épis moins nombreux, à tomentum d'un jaune pâle plus ou moins doré et rompu, le callus des épillets fortement poilu muni de poils atteignant  $1/3-1/4$  de l'épillet, par la villosité de la tige et des feuilles.

***Apocopis cochinchinensis* A. Camus sp. nova.**

*Planta annua. Culmi graciles, erecti, glaberrimi, 30-40 cm. alti. Laminae foliorum 3-4 cm. longæ, 2-4 mm. latæ, apice attenuatæ, utrinque pilis plus minus adspersæ. Vaginæ angustatæ, superne pilosæ. Ligula membranacea, brevis. Racemi semper gemini, erecti, 1-1.5 cm. longi, graciles, pallide flavescens; articuli graciles spiculæ 3-plo breviores, pilis flavescens ciliati. Spiculæ sessiles 3-4 mm. longæ, lineari-oblongæ, apice attenuatæ, callo pilis gluma 4-plo brevioribus barbato: gluma I<sup>ma</sup> chartacea, superne membranacea, oblonga, truncata, apice rubra, dorso glabra, margine ciliolata, 5-nervis: II<sup>da</sup> I<sup>am</sup> superans, anguste oblonga, truncata, apice rubra, glabra; III<sup>a</sup> ♂, primâ paulo brevior, ovato-oblonga, subacuta, hyalina, alba; ejus palea similima; antheræ floris ♂ 2 mm. longæ. Gluma IV<sup>a</sup> quam II<sup>da</sup> brevior, hyalina, oblonga, apice attenuata, 2-dentata; arista 1/4 mm. longa, columna fusca hirtula subulam pallidiorem subæquante. Pedicelli steriles articulis paulo longiores, barbati.*

Cochinchine (Pierre).

Diffère de l'*A. Wightii* Nees par ses épillets étroitement linéaires-oblongs, non dilatés vers le sommet, la glume supérieure nettement plus longue que l'inférieure, la glumelle inférieure de la fleur supérieure plus courte.

**Germania Thorelii** A. Camus sp. nova.

Annua. Culmi 40-50 cm. alti, graciles, apice teretiusculi, glaberrimi, superne filiformes, longe uulsi, infra racemum incrassati, plurinodes, e nodis ramos filiformes solitarios subrectos agentes. Laminae lineares, subcutae, breves, 3 cm. longae, 2.5-3 mm. latae, etiam margine leues, glabrae; costa media crassiuscula, subtus carinata, nervis lateralibus primariis utrinque 2 parum prominulis. Vaginae latiusculae, carinatae, pilosulae, inferiores aggregatae, superiores internodiis breviores, summa cum lamina brevissima. Ligula oblonga, membranacea, pilosa. Spiculae involucentes appressae erectae, 1 3/4 mm. longae; gluma I<sup>ma</sup> coriacea, late oblonga, apice truncata, abrupte bidentata, marginibus non implicata, glaberrima, 7-nervis; II<sup>a</sup> I<sup>am</sup> superans, membranacea, lineari-lanceolata, apice erosula, subtruncata, ciliolata; III<sup>a</sup> secunda paulo brevior, hyalina oblonga, apice ciliolata; palea hyalina, ciliolata; IV<sup>a</sup> II<sup>am</sup> subaequans, hyalina, lineari-oblonga, acuta, apice ciliolata<sup>(1)</sup>.

Laos : rivière d'Ubon (Thorel).

Diffère du *G. capitata* Bal. et Portr. par son port grêle, ses feuilles très courtes, les sup. à limbe rudimentaire, glabre, à bords et à faces lisses, la glume inf. des épillets involucrents glabre un peu atténuée au sommet, puis munie de deux pointes latérales plus longues et au milieu presque tronquée à angle droit.

(1) Je décris cette espèce sur des individus assez nombreux mais âgés dont il ne reste de l'inflorescence que les épillets involucrents.